

## CISARAL® DROPS

### SAMENSTELLING

#### 1 ml bevat:

1 mg cisapride.

### FARMACEUTISCHE VORM

Orale suspensie.

### DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Terrariumdieren, kooi- en volièrevogels, post- en sierduiven en niet bedrijfsmatig gehouden kleine knaagdieren.

### INDICATIES

Bevorderen van de maaglediging.

### CONTRA-INDICATIES

Darmobstructies of darmperforaties.

### BIJWERKINGEN

Abdominale krampen en diarree.

### WAARSCHUWINGEN

De absorptie van sommige farmaca kan worden versneld door het bevorderende effect van cisapride op de maaglediging.

### DOSERING EN TOEDIENINGSWEG

Schudden voor gebruik.

Uitsluitend voor orale toediening.

De dosering bedraagt 0,25 tot 0,5 mg per kg lichaamsgewicht 2 tot 4 maal daags (=0,25 tot 0,5 ml per kg lichaamsgewicht 2 tot 4 maal daags).

### FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

Cisapride heeft een gastrokinetisch effect.

Cisapride heeft geen antidopaminerge eigenschappen en kan dus geen extrapiramidale verschijnselen en hyperprolactinemie uitlokken. Cisapride verhoogt de druk in de onderste slokdarmsfincter, het stimuleert de maagcontractiliteit, bevordert de antroduodenale coördinatie en versnelt de maaglediging evenals lediging van de dunne en dikke darm. Deze effecten berusten in hoofdzaak op een bevordering van de afgifte van acetylcholine uit de cholinerge neuronen in de plexus myentericus. Dit effect is beperkt tot de cholinerge innervatie van de gladde spierlaag van het maagdarmkanaal, daar maagzuursecretie en intestinale secretie niet beïnvloed worden.

### BEWARING

In de oorspronkelijke verpakking en buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Niet bewaren boven 25°C.

Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

### VERPAKKING

Flacon met 30 ml.

### STATUS

05.2015

Versie 02

*Dit diergeneesmiddel is conform artikel 3.19 van het Besluit Diergeneesmiddelen van 2 November 2012 vrijgesteld van registratie.*