

# BIJSLUITER

## **GENTAPOLYCORT® oogdruppels voor honden en katten**

### **NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND**

Houder van de vergunning voor het in de  
handel brengen:

AST Beheer B.V.  
Wilgenweg 7  
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma B.V.  
Forellenweg 16  
4941 SJ Raamsdonksveer

### **BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Gentapolykort oogdruppels voor honden en katten

### **GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDD(E)L(EN)**

Per ml:

#### **Werkzame bestanddelen**

Gentamicine (als gentamicinesulfaat) 3 mg  
Polymyxine-B (als Polymixine-B-sulfaat) 1 mg  
Dexamethason (als dexamethasondinatriumfosfaat)  
1 mg

#### **Hulpstoffen**

Fenylkwikboraat  
Natriummetabisulfaat (E223)

### **INDICATIES**

Ontstekingen van het voorste oogsegment zoals keratoconjunctivitis, allergische conjunctivitis, sklerokeratitis en blepharitis veroorzaakt door voor gentamicine en polymyxine gevoelige bacteriën zoals *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus spp.* of *Staphylococcus aureus* op geleide van een antibiogram.

### **CONTRA-INDICATIES**

Niet gebruiken bij:

- Ulcus cornea;
- Oogaandoeningen die gepaard gaan met diepe ulcerate zonder vascularisatie;
- Oogaandoeningen van virale oorsprong;
- Glaucoom.

### **BIJWERKINGEN**

- Topicaal toegepaste corticosteroïden kunnen de intraoculaire druk verhogen.
- Topicaal toegepaste corticosteroïden remmen de epithelisatie van de cornea.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiters worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

### **DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS**

Hond en kat.

### **DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGS- WEG(EN)**

1-2 druppels, 3-4 maal daags in de conjunctivaalzak toedienen, gedurende 3-5 dagen.

### **AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING**

Uitsluitend bestemd voor uitwendige toediening.

### **WACHTTERMIJN**

Niet van toepassing.

### **SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:

Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: 30 dagen.

## **SPECIALE WAARSCHUWINGEN**

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort

waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Bij diepe ooginfecties waarbij dreiging bestaat voor een systemische infectie, tevens systemische antibiotica toedienen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen

door degene die het diergeneesmiddel aan

de dieren toedient

In verband met mogelijke sensibilisatie en overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de dracht en lactatie.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen

en andere vormen van interactie

Geen gegevens beschikbaar.

Overdosering (symptomen, procedures in

noodgevallen, antidota)

Niet van toepassing.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet het middel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

## **SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

## **DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN**

maart 2014

## **OVERIGE INFORMATIE**

Bruin glazen (type I) flacon à 5 ml, met butylrubber stopdruppelaar en een polyethyleen schroefdop. Per stuk verpakt in een kartonnen doosje.

## **KANALISATIE**

UDD

## **REG NL 2755**