

# BIJSLUITER

## MEBENDORAL KH® 100 mg

### tabletten voor honden en katten

#### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

AST Beheer B.V.  
Wilgenweg 7  
3421 TV Oudewater  
Nederland

#### Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Lelypharma B.V.  
Zuiveringweg 42  
8243 PZ Lelystad  
Nederland

#### **BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Mebendoral KH 100 mg, tablet voor honden en katten  
Mebendazol

#### **GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN**

Per tablet:

##### **Werkzaam bestanddeel:**

Mebendazol 100 mg

#### **INDICATIES**

Behandeling van wormbesmettingen veroorzaakt door:

##### Hond:

- spoelwormen *Toxocara canis* en *Toxascaris leonina*;
- haakwormen *Uncinaria stenocephala* en *Ancylostoma caninum*;
- zweepworm *Trichuris vulpis*;
- lintwormen *Taenia pisiformis*, *Taenia hydatigena* en *Echinococcus granulosus*.

##### Kat:

- spoelwormen *Toxocara cati* en *Toxascaris leonina*;
- haakworm *Ancylostoma tubaeforme*;
- lintworm *Taenia taeniaeformis*.

#### **CONTRA-INDICATIES**

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of (een van) de hulpstoffen.

#### **BIJWERKINGEN**

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

#### **DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS**

Hond, Kat

#### **DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG**

Voor oraal gebruik.

De tablet kan toegediend worden door:

- (1) achter in de keel te brengen en te laten doorslikken,
- (2) te verpulveren en met voeder of drank te mengen, of
- (3) toe te dienen in een vleesballetje

De aanbevolen doseringen zijn als volgt:

##### honden en katten die alleen met ascariden besmet zijn:

Pups en kittens:

50 mg mebendazol 's morgens en 50 mg mebendazol 's avonds gedurende 2 dagen.

Volwassen dieren:

100 mg mebendazol 's morgens en 100 mg mebendazol 's avonds gedurende 2 dagen.

##### honden en katten die niet alleen met ascariden besmet zijn:

Gewicht minder dan 2 kg:

50 mg mebendazol 's morgens en 50 mg mebendazol 's avonds gedurende 5 dagen.

Gewicht tussen 2 kg en 30 kg:

100 mg mebendazol 's morgens en 100 mg mebendazol 's avonds gedurende 5 dagen.

Honden zwaarder dan 30 kg:

200 mg mebendazol 's morgens en 200 mg mebendazol 's avonds gedurende 5 dagen.

#### **AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING**

Geen.

#### **WACHTTERMIJN**

Niet van toepassing.

#### **SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN**

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

#### **SPECIALE WAARSCHUWINGEN**

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Intensief gebruik of misbruik van anthelminthica kan leiden tot resistentie.

##### Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het lichaamsgewicht dient zo nauwkeurig mogelijk bepaald te worden voor het vaststellen van de benodigde dosering, indien nodig.

##### Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Gebruik tijdens de dracht wordt niet aanbevolen, omdat uit laboratoriumstudies bij ratten en muizen teratogene, materno- en foetotoxische effecten bleken.

#### **SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

#### **DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN**

5 januari 2016

#### **OVERIGE INFORMATIE**

REG NL 7334

#### **Kanaliseringscode**

VRIJ



AST Farma B.V.  
Oudewater