

CLINDACUTIN®

Diergeneesmiddel UDA

Samenstelling

Bevat per gram 10 mg clindamycine (als clindamycinehydrochloride).

Beschrijving

Clindamycine, een antibioticum uit de groep van de lincomycines, remt de bacteriële eiwit-synthese. Het aangrijpingspunt bevindt zich in de 50 S-subunit. Clindamycine veroorzaakt een irreversibele verandering van de eiwitvormende subcellulaire elementen op ribosomaal niveau. Clindamycine vertoont in vitro activiteit tegen voornamelijk gram-positieve bacteriën en anaërobe micro-organismen. Clindamycine is speciaal werkzaam tegen aërobe gram-positieve coccen zoals *Staphylococcus aureus* (penicillinase- en niet-penicillinase vormende stammen), *Staphylococcus epidermis* en *Streptococci* (m.u.v. *Str. faecalis*). De consistentie van de zalf verhindert het vastklevan van een gasje aan wonden.

Indicaties

Behandeling van oppervlakkige geïnfecteerde wonden bij honden veroorzaakt door voor clindamycine gevoelige bacteriën (met name *Staphylococcus* spp. en *Streptococcus* spp.); Tussenteeneczeem veroorzaakt door *Staphylococcus intermedius*.

Contra-indicaties

- overgevoeligheid voor één van de bestanddelen;
- dracht.

Bijwerkingen

Diarree.

Waarschuwingen

- oplikken van de zalf dient voorkomen te worden;
- dit produkt is uitsluitend geschikt voor de behandeling van oppervlakkige huidaandoeningen;
- niet toedienen aan drachtige dieren.

Toedieningswijze en dosering

Uitsluitend bestemd voor lokale huid-behandeling bij honden.

3 tot 4 maal daags voorzichtig een dunne laag op de te behandelen huddelen aanbrengen tot verbetering optreedt en genezing is bereikt. De maximale behandelingsduur bij oppervlakkige, geïnfecteerde wonden is maximaal 7 dagen en bij tussenteeneczeem 14 dagen. Indien er binnen 3-4 dagen na het begin van de behandeling geen verbetering optreedt dient de behandeling te worden gestopt.

In acht te nemen veiligheidsmaatregelen

In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huid-contact vermeden te worden; draag daartoe handschoenen.

Bewaring

Bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten het bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid aangebroken verpakking: 30 dagen (bij kamertemperatuur).

Verpakking

10, 20 en 60 g.

REG NL 08043

Registratiehouder

AST Beheer B.V., Oudewater.

Status

01.1994.

Fabrikant: Produlab Pharma, Raamsdonksveer.