

# CORTALONE®

Triamcinolonacetonide 10 mg/ml

Diergeneesmiddel UDA

## Eigenschappen

Triamcinolonacetonide heeft een uitgesproken glucocorticosteroïde werking, zonder de nadelige mineralocorticosteroïde effecten.

## Indicaties

Bij honden en katten:

- allergische huidaandoeningen
- met jeuk gepaard gaande dermatosen.

## Toedieningswijze

**GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK!**

Intramusculair of subcutaan toedienen.

## Dosering

Eenmalig 1 mg triamcinolonacetonide per 5 kg lichaamsgewicht (= 0,1 ml CORTALONE).

## Contra-indicaties

- virusinfecties;
- diabetes mellitus;
- osteoporose;
- hartafwijkingen;
- nierafwijkingen;
- schimmelinfecties;
- cornea ulcera;
- brandwonden;
- toedieningen in hoge doseringen aan drachtige dieren.

## Bijwerkingen

- mogelijke abortus in het laatste derde deel van de dracht;
- afnemende weerstand tegen alle ziekteverwekkers: verhoogde kans op septicaemie en septische cystitis, maskering van infecties, immunosuppressieve werking;

- bijniersuppressie bij langer durende behandeling met kans op bijnierinsufficiëntie bij belasting van het dier zoals stress en bij acuut stoppen van de therapie;
- katabolisme met als gevolg: spieratrofie, myopathie en vertraging van de wondgenezing;
- osteoporose;
- remming van de lengtegroei van beenderen;
- huidatrofie;
- kans op diabetes mellitus;
- polyurie, polydipsie;
- polyphagie;
- euforie;
- ulceraties in het gastro-intestinale systeem;
- pancreatitis;
- hyperlipidaemie;
- toename van de lipolysis;
- vette infiltratie van de lever met steroidhepatopathie;
- remming van het hypothalamus-hypofyse-bijnierschors systeem;
- afname van de thyroïd synthese;
- toename van de parathyroïd synthese;
- morbus Cushing.

## Wijze van bewaren

Bij kamertemperatuur (15-25°C) en in het donker bewaren.

## Voorzorgen

Bij de toepassing direct huidcontact vermijden.

## Verpakking

Verpakking met 10 ml.

## REG NL 03918

## Registratiehouder

AST Beheer B.V., Oudewater.