

# ENROFLOXORAL® 25/50/150 mg tabletten

**Enrofloxoral® 25 mg Registratienummer: REG NL 109966**  
is geregistreerd voor: **hond en kat**

**Enrofloxoral® 50 mg Registratienummer: REG NL 103754**  
is geregistreerd voor: **hond**

**Enrofloxoral® 150 mg Registratienummer: REG NL 103755**  
is geregistreerd voor: **hond**

## Registratiehouder:

AST Beheer BV, Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater

## Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma B.V., Forellenweg 16, 4941 SJ Raamsdonksveer

## GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Werkzaam bestanddeel:

Enrofloxacin 25 mg, 50 mg of 150 mg.

## INDICATIES

Enrofloxacin mag alleen geïndiceerd op geleide van een specifiek antibiogram worden toegepast;

- Infecties met voor enrofloxacin-gevoelige bacteriën en mycoplasmata, met name infecties van:
    - het maagdarmkanaal veroorzaakt door *Escherichia coli* en *Salmonella* spp.;
    - de luchtwegen veroorzaakt door *Pasteurella* spp., *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., *Bordetella* spp., *Staphylococcus* spp., *Pseudomonas* spp., *Mycoplasma* spp., diverse gram-negatieve bacteriën;
    - de urinewegen veroorzaakt door *Escherichia coli*, *Staphylococcus* spp., *Klebsiella* spp., *Pseudomonas* spp., *Proteus* spp.;
    - de geslachtsorganen veroorzaakt door *Escherichia coli*, *Staphylococcus* spp., *Pseudomonas* spp., *Proteus* spp., *Brucella canis*, *Mycoplasma* spp.;
    - de huid veroorzaakt door *Staphylococcus* spp., *Escherichia coli*, *Pseudomonas* spp., *Proteus* spp.;
    - wonden veroorzaakt door *Escherichia coli*, *Staphylococcus* spp., *Pseudomonas* spp., *Proteus* spp.;
    - otitis media veroorzaakt door *Pasteurella* spp., *Staphylococcus* spp.
- En andere voor enrofloxacin gevoelige bacteriën.

## CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij:

- opgroeiende honden tot de leeftijd van één jaar en bij zeer grote rassen tot de leeftijd van 18 maanden, aangezien er beschadiging van het gewrichtskraakbeen kan optreden.
- katten jonger dan 8 weken.

## BIJWERKINGEN

Geen bekend. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiting worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

## DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Hond, kat.

Enrofloxoral 25 mg tabletten is bestemd voor honden en katten.

Enrofloxoral 50 mg tabletten is bestemd voor honden.  
Enrofloxoral 50 mg tabletten niet toedienen aan honden lichter dan 2,5 kg.  
Gebruik voor deze huisdieren de tabletten van 25 mg.

Enrofloxoral 150 mg tabletten is bestemd voor honden.  
Enrofloxoral 150 mg tabletten niet toedienen aan honden lichter dan 7,5 kg.

Gebruik voor deze huisdieren de tabletten van 25 of 50 mg.

## DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN VAN TOEDIENING

### Dosering (hond en kat):

Richtdosis: 5 mg enrofloxacin per kg lichaamsgewicht éénmaal per dag.

Dit komt overeen met:

- één tablet van 25 mg per 5 kg lichaamsgewicht;
- één tablet van 50 mg per 10 kg lichaamsgewicht (**alleen voor honden**);
- één tablet van 150 mg per 30 kg lichaamsgewicht (**alleen voor honden**).

Vermijd doseringen hoger dan deze voorgeschreven.

### Behandelingsduur:

5 à 10 dagen, naargelang de ernst van de aandoening en de evolutie van het genezingsproces.

## AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Dit product is bestemd voor orale toediening, als dusdanig of vermengd met voedsel.

## WACHTTERMIJN

Niet van toepassing.

## SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Voor dit diergeneesmiddel is er geen speciale bewaar temperatuur. Bewaren in de omverpakking ter bescherming tegen licht. Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos na EXP.

## SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Wanneer het product wordt gebruikt dient rekening gehouden te worden met het officiële en nationale beleid ten aanzien van antimicrobiële middelen.

Het gebruik van fluoroquinolonen dient te worden beperkt tot behandeling van aandoeningen die slecht hebben gereageerd of naar verwachting slecht zullen reageren op andere groepen antimicrobiële middelen.

Indien mogelijk dienen fluoroquinolonen uitsluitend te worden gebruikt op basis van gevoeligheidstesten.

Wanneer het product anders wordt gebruikt dan aangegeven in de SPC kan dit het aantal bacteriën dat resistent is tegen fluoroquinolonen verhogen en de effectiviteit van behandeling met andere quinolonen verminderen vanwege de mogelijkheid van kruisresistentie. Bij overdosering kunnen retinotoxische effecten, waaronder blindheid, optreden in katten.

## SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen ter bescherming van het milieu.

## DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

17 januari 2012

Enrofloxoral zijn SMARTTAB tabletten.

Deze zijn eenvoudig in twee (Enrofloxoral 50 en 150 mg) of vier (Enrofloxoral 25 mg) gelijke stukjes te verdelen.

