

RONIZOL® 2,5% **Opl. poeder voor oraal gebruik** **bij duiven**

Ronidazol

Samenstelling

Per gram: **Werkzaam bestanddeel:**

Ronidazol 25 mg.

Farmaceutische vorm

Poeder voor oraal gebruik.

Doeldier(en) Duif.

Indicaties

Hulpmiddel bij de bestrijding van trichomoniasis ('het geel').

Bijwerkingen

- verminderde wateropname - neurotoxiciteit -
groeiremming - gewichtsverlies - verstoorde
spermatogenese - dunne ontlasting.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige
reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in
kennis te stellen.

Dosering en toedieningswijze

Voor oraal gebruik, toediening in het drinkwater.
1 nauwkeurig afgestreken maatschepje (5 ml = ca.
4 gram) per 3 liter drinkwater (33 mg ronidazol per
liter) gedurende 5 dagen. Gemedicineerd
drinkwater dient dagelijks verversd te worden. De
opname van gemedicineerd drinkwater is
afhankelijk van de klinische conditie van de dieren.
Teneinde een juiste dosering te verkrijgen, dient de
concentratie ronidazol in het drinkwater
dienovereenkomstig te worden aangepast.

Wachttermijn

Niet voor gebruik bij duiven die voor humane
consumptie bestemd zijn.

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het geneesmiddel bestemd is

Bij behandeling met ronidazol verdwijnen slechts de
klinische symptomen van trichomoniasis. Eliminatie
van de infectie is onvolledig.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Ronidazol is toxisch bij langdurige behandeling.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Adem deze stof niet in aangezien dit middel kanker
en erfelijke genetische schade kan veroorzaken en
vermijd aanraking met de huid. Draag daartoe een
stofmasker en geschikte handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Mogelijk nadelige effecten op de vruchtbaarheid en
de jonge duiven van dieren die behandeld zijn met
dit middel zijn niet uit te sluiten.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet combineren met andere antimicrobiële of
antiparasitaire middelen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen
bekend dan die genoemd onder de sectie
'bijwerkingen'.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de
verenigbaarheid, moet dit diergeneesmiddel niet
met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum
vermeld op het etiket na EXP.
Houdbaarheid van het gemedicineerde drinkwater:
1 maand (in afgesloten fles, beneden 25°C).

Bewaring

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de
vriezer bewaren.

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten
hiervan dienen in overeenstemming met de
nationale vereisten te worden verwijderd.
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
UDD.

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Registratiehouder

AST beheer B.V., Oudewater.

REG NL 7404

De datum waarop de tekst voor het laats is herzien

12 augustus 2013

Fabrikant: LelyPharma, Lelystad.