

BIJSLUITER

VETADERM® emulsie voor cutaan gebruik bij katten en honden

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE

Registratiehouder:
AST Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

De fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Vetaderm, emulsie voor cutaan gebruik bij katten en honden.

GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTAND- DELEN

Per ml

Werkzaam bestanddeel:

Neomycinesulfaat 1,17 mg
Hydrocortisonacetaat 1,34 mg

Hulpstoffen:

Natrium methylparahydroxybenzoaat (E218)

INDICATIES

Hond en kat:

- pyo(traumatische) dermatitis veroorzaakt door *Staphylococcus aureus*;
- brandwonden van de eerste graad

Kat:

- chronische dermatitis bij de kat veroorzaakt door *Staphylococcus* spp.

CONTRA-INDICATIES

Geen.

BIJWERKINGEN

Na langdurig gebruik kan superinfectie met gisten en schimmels plaatsvinden.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiters worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMID- DEL BESTEMD IS

Hond en kat.

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN VAN TOEDIENING

Cutaan gebruik.

Schudden voor gebruik.

Aangetaste plekken 2 - 3 maal per dag inspraken,
bij verbetering 2 - 3 maal per week, gedurende maximaal
14 dagen.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Niet van toepassing.

WACHTTERMIJN

Niet van toepassing.

SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer
bewaren.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op
het etiket na EXP:.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toe- dient

In verband met mogelijke sensibilisatie en overgevoelig-
heidsreacties dient bij toepassing direct huidcontact te
worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen
tijdens dracht en lactatie.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEES- MIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan die-
nen in overeenstemming met de nationale vereisten te
worden verwijderd.

Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmidde-
len verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter
bescherming van het milieu.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

3 oktober 2012

OVERIGE INFORMATIE

Verpakkingsgroottes:

Flacon van 60 ml

Flacon van 120 ml

Flacon van 500 ml

REG NL 9655

KANALISATIE

UDA